

ロタリックス®内用液 接種前にお読みください

ロタリックス®内用液とは？

ロタリックス®内用液は自然感染を模倣したヒト由来の弱毒生ワクチンであるため、腸管内で十分に増え、抵抗力(免疫)を獲得します。



Point

ワクチンの全量を飲み込めない場合もありますが、飲み込みが確認できていれば、十分効果が期待できます。

こんなことがあっても大丈夫(接種後から10分程度)



ロタリックス®内用液 接種後にお読みください

● 接種後30分は安静にしてください

重いアレルギー症状が出ることもあるため、帰宅せずに様子を見てください。



● 当日は過激な運動をさせないでください

母乳の摂取などを含め、その他の日常生活はいつもどおりに行ってください。

● 健康状態や体調の変化にご注意ください

健康状態の観察を行い、体調の変化に十分注意してください。高熱、けいれんなどの異常な症状がみられた場合は、速やかに医師の診察を受けるようにしてください。




● 衛生状態に注意してください

ワクチン接種後1週間程度は便中にウイルスが排泄されますが、排泄されたウイルスによって胃腸炎を発症する可能性は低いことが確認されています。念のために、おむつ交換後などワクチン接種を受けたお子様と接した際には手洗いをするなど注意してください。特にご家族の中で免疫系に異常のある方がいる場合には、ワクチン接種を受けたお子様と接したあとの手洗いを徹底するなど注意してください。



● 腸重積の症状にご注意ください

接種後に次のような症状がみられた場合は、家庭で様子を見て症状を長引かせないように、速やかに医師の診察を受けるようにしてください。



- ぐったりする(不機嫌)
- 泣きと不機嫌を繰り返す
- 顔色が悪い
- 繰り返し起きるおう吐
- イチゴジャムのような血便
- お腹のはり



海外の市販後調査では、初回接種から31日間(腸重積のほとんどは初回接種から7日間に発症)は腸重積のリスクが増加する可能性があると考えられていますので、この期間は健康状態を十分に観察してください。